



ФОЛИФЛО® Zn FOLIFLO MAIA

700 гр/л Цинк суспензия

Състав	Общо Цинк (Zn) 40,0% (700 г/л)
Формулация	Суспензия (спец. маса: 1,75 кг/л при 20° C)
Стабилност	Продуктът е стабилен за поне 18 месеца при нормални температури и налягане в затворени опаковки. Да се съхранява на температури между 4° и 30° C.
Опаковка	12 x 1 л (12 x 1,75 кг) - 10 л (17,5 кг)

Описание

ФОЛИФЛО® Zn е продукт, съдържащ Цинк и е изключително ефикасен за превенция и бързо лечение на симптоми на Цинков дефицит; подпомага развитието на корена, качеството на листата и оцветяването на плода. Цинкът е в недостиг при отмити и кисели почви или в такива с алкална реакция. Затруднена абсорбция на Цинк има и при богати на Фосфор почви. Най-взискателните култури са: плодни дървета, лозя, домати, зърнени, царевица, картофи и др.

Внимание

В оранжерии да не се надвишава концентрация от 50 мл/100 л. В случай на смесване с повече продукти, да се прави тест в малки количества. Не пръскайте при горещо, слънчево време и по време на цъфтеж. Присъствието на Мед върху листната маса може да забави абсорбцията на продукта.



Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Мах. Кнцтр%	
Винени лозя	0,8 - 1,2	0,2 - 0,3	Преди цъфтеж и при залагане на плода
Зимни житни	0,8 - 1,2	0,4 - 0,6	От братене до начало на изкласяването
Царевица	0,8 - 1,2	0,4 - 0,6	Съвместно с вегетационните хербициди
Памук	1 - 1,5	0,3	През време на вегетацията
Кафе	1 - 1,5	0,2	1-2 внасяния през вегетацията
Картофи	0,8 - 1,2	0,4 - 0,6	1 седмица след оформяне на редовете
Домати на полето, Пълеша, Дини	0,8 - 1,2	0,3 - 0,4	На фаза 4-6 лист
Ябълка, Круша, Костилкови	0,8 - 1,2	0,1	Преди цъфтеж и след реколтиране; преди падане на листата