

ФОЛИМАК® Sugar-B DOLCE



PK Fertiliser 25.26 with Boron (B)

Състав	Водоразтворим Фосфор (P ₂ O ₅)	25,0%
	Водоразтворим Калиев окис (K ₂ O)	26,0%
	Водоразтворим Бор (B)	10,0%
Формулация	Разтворим прах	
Опаковка	6 x 2 кг - 10 кг	

Описание

ФОЛИМАК® Sugar-B е изцяло разтворим PK тор, богат на Бор, за бърза абсорбция чрез листно пръскане. Тази иновативна формулация, без Натрий и Карбонат, с ниско съдържание на хлорид, стимулира натрупването на захари, както в растението, така и в плодовете. ФОЛИМАК® Sugar-B се използва при захарно цвекло, за да повиши захарта, чистотата на сока и алкалността. При винени лозя и плодни дървета повишава съдържението на захар в плодовете и устойчивостта при съхранение на студено, като подобрява вдървесиняването и устойчивостта на температурен стрес.

Внимание

Дозите и концентрациите могат да варират в зависимост от агрономическите условия. В случай на смесване с няколко продукта, винаги правете тест в малки количества. Да не се употребява по време на цъфтеж. Избягвайте пръскане в горещи и слънчеви дни. В концентриран разтвор не смесвайте с Калций.

Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	кг/ха	Концентрация (г/100 л)	
Захарно цвекло	2 - 3	500 - 600	2-3 пръскания след фаза затваряне на редовете с ПРЗ
Морков	2 - 3	500 - 600	След 1-см Ø корени, 2-3 пръскания
Фенел, Целина, Броколи и Кръстоцветни (Зеле и др.)	1,5 - 2,5	250 - 300	Фази на натрупване, 2-3 пръскания
Пълеш, Домат	1,5 - 2	200 - 250	Развитие на плода и узряване, 3-4 пръскания
Грозде и Плодни дървета	2 - 3	200 - 300	2-3 внасяния през вегетацията
Грозде и плодни дървета (млади насаждения)	3 - 4	300 - 400	За подобряване на вдървесиняването и устойчивостта на температурен стрес, 2-3 пръскания през лято и късно лято и през ранна есен