



220 гр/л Калциев окис в комплекс с Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)

Състав	Общо водоразтворим Калциев окис (CaO)	15,0% (220 г/л)
	Общо Калциев окис (CaO) в комплекс с LSA	12,0% (176 г/л)
<i>Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)</i>		
Формулация	Разтвор (спец. маса: 1,47 кг/л при 20° С)	
Стабилност	Продуктът е стабилен за поне 24 месеца при нормални температури и налягане в затворени опаковки. Да се съхранява на температури между 4° и 30° С.	
Опаковка	1 л (1,47 кг) - 10 л (14,7 кг)	

Описание

ФОЛИСТИМ™ LSA Ca е течен тор без Хлор с висока концентрация на Калций, за предпазване от "горчиви ядки" при ябълка, "пукане на плода" при костилковите, "върхов пригор" при листните зеленчуци, "увяхване на цвета" при домати на полето и други от соланацеа, "черна сърцевина" при зелето и карфиола, "черни петна" при кореноплодни и др. Болести, причинени от недостига на Калций главно в клетъчната стена. Недостигът на Калций намалява мембранната пропускливост и стресира клетката. ФОЛИСТИМ™ LSA Ca регулира водния баланс в младата тъкан и повишава съхраняемостта, предпазва от загиване при съхранение. При лозя – намалява предразположеността към загиване на плода, което редуцира необходимостта от чести РЗ третирания и води по – нисък риск от некачествен сок. При зеленчуковите култури намалява солевия стрес. ФОЛИСТИМ™ LSA Ca е формулация с отлична смесимост с повечето използвани в практиката пестициди.

Внимание

Дозите и концентрациите могат да варират в зависимост от агрономическите условия. В случай на смесване с няколко продукта, винаги правете тест в малки количества. Да не се употребява по време на цъфтеж. Избягвайте пръскане в горещи и слънчеви дни. Придържайте се към препоръчаната концентрация независимо от обема на пръскане на акър. При лилиум и в оранжерии не надвишавайте концентрация от 50 мл/100 л.

Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Max. Концентр. %	
Круша и Ябълка	3 - 4	300	Всеки 10-15 дни от фаза големина на „орех“ на плода
Зеленчукови	плодни	2 - 3	Всеки 8-12 дни след образуване на първите плодове Всеки 6-10 дни от формиране на главата
	листни	1 - 2,5	
Костилкови	3 - 4	200 - 250	3 внасяния на всеки 15 дни до фаза на прошарване
Винени лозя (Шардоне & други чувствителни на гниене на грозда)	3 - 4	200 - 350	Всеки 10-15 дни от затваряне на грозда
Цветя	1 - 2	200 - 250	Ежеседмично
Капково	20 - 30		