

# ФОЛИСТИМ™ LSA Комби FOLISTIM Sistema



**5,8 гр/л Мед + 23 гр/л Манган + 11,5 гр/л Цинк в комплекс с  
Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)**

<b>Състав</b>	Общо водоразтворима Мед (Cu)	0,5% (5,8 г/л)
	Общо водоразтворим Манган (Mn)	2,0% (23,0 г/л)
	Общо водоразтворим Цинк (Zn)	1,0% (11,5 г/л)
<i>Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA) Серен триоксид (SO<sub>3</sub>), общо разтворим във вода 5,0% (57,0 г/л)</i>		

<b>Формулация</b>	Разтвор (спец. маса: 1,15 кг/л при 20° C)
<b>Стабилност</b>	Продуктът е стабилен за поне 24 месеца при нормални температури и налягане в затворени опаковки. Да се съхранява на температури между 4° и 30° C.

**Опаковка** 10 л (11,5 кг)

## Описание

ФОЛИСТИМ™ LSA Комби е лесен за употреба течен тор с Мед, Манган и Цинк, Лигнин Сулфонати и Сяра. С бърз зелен ефект и с действие, повишаващо добива и протеиновото съдържание. Течната формулация е лесна за работа и приложима с всяка техника за пръскане. ФОЛИСТИМ™ LSA Комби е напълно смесим с повечето приложими в практиката пестициди.

## Внимание

Дозите и концентрациите могат да варират в зависимост от агрономическите условия. В случай на смесване с няколко продукта, винаги правете тест в малки количества. Да не се употребява по време на цъфтеж. Избягвайте пръскане в горещи и слънчеви дни. Придържайте се към препоръчаната концентрация независимо от обема на пръскане на хектар. В оранжерии не надвишавайте концентрация от 50 мл/100 л.

Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Мах. Концентр. %	
Пшеница	1 - 2	0,25 - 0,50	От братене до първо видимо коляно
Царевица	1 - 1,5	0,25	1 внасяне на фаза 3 лист
Рапица	1 - 1,5	0,25 - 0,50	1 внасяне на фаза 4-6 лист
Захарно цвекло	1 - 1,5	0,25 - 0,50	1 внасяне на фаза 4-6 лист
Картофи	2	0,25 - 0,50	1 седмица след поникване
Капково	5 - 10		