

ФОЛИСТИМ™ LSA Cu TURBI



180 гр/л Мед в комплекс с Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)

Състав	Водоразтворима Мед (Cu)	12,5% (180 г/л)
	Общо Мед (Cu) в комплекс с LSA	10,0% (144 г/л)
	<i>Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)</i>	

Формулация	Разтвор (спец. маса: 1,4 кг/л при 20° С)
Стабилност	Продуктът е стабилен за поне 24 месеца при нормални температури и налягане в затворени опаковки. Да се съхранява на температури между 4° и 30° С.

Опаковка 10 л (14 кг)

Описание

ФОЛИСТИМ™ LSA Cu е формулация, съдържаща Мед в комплекс с амониев лигнин сулфонат (LSA), с отлична листна усвояемост от растенията. Липсата на Мед се проявява особено силно в почви с високо съдържание на органична материя и при високи норми на Азот. LSA Cu е ефикасен при превенция и лечение на дефицити на Мед като: листни некрози и хлорози (при зърнените), потиснат и забавен растеж и проблем с опрашването и изпълването на класа. Благодарение на формулацията си ФОЛИСТИМ™ LSA Cu позволява за бързо и насочено внасяне, което да коригира потенциално опасни хранителни дефицити.

Внимание

Дозите и концентрациите могат да варират в зависимост от агрономическите условия. В случай на смесване с няколко продукта, винаги правете тест в малки количества. Да не се употребява по време на цъфтеж. Избягвайте пръскане в горещи и слънчеви дни. Придържайте се към препоръчаната концентрация независимо от обема на пръскане на акър. В оранжерии не надвишавайте концентрация от 50 мл/100 л.

Култура	Доза		Време и начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Мак. Концентр. %	
Пшеница, Ечемик Овес	1,5 - 2	0,5	От братене до начало на изкласяване
Захарно цвекло, Царевица, Рапица, Слънчоглед	1,5 - 2	0,5	1 внасяне във фаза 4-6 лист
Соя, Люцерна Грах	1 - 2	0,5	1-2 внасяния при наличие на видими симптоми
Зеленчукови	1 - 2	0,4	Внасяне при наличие на 4-6 листа
Лозя и плодни дървета	1 - 2	0,3	1-2 внасяния при първи видими симптоми
Капково	2 - 5		