



ФОЛИСТИМ™ LSA Zn RAGGIO



200 гр/л Цинк в комплекс с Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)

Състав	Водоразтворим Цинк (Zn) 14,0% (200 г/л) Общо Цинк (Zn) в комплекс с LSA 11,2% (160 г/л) <i>Комплексообразувател: Амониев Лигнин Сулфонат (LSA)</i>
Формулация	Разтвор (спец. маса: 1,49 кг/л при 20° С)
Стабилност	Продуктът е стабилен за поне 24 месеца при нормални температури и налягане в затворени опаковки. Да се съхранява на температури между 4° и 30° С.
Опаковка	10 л (14,9 кг)

Описание

ФОЛИСТИМ™ LSA Zn е висококонцентрирана формулация от Цинк, високо ефективна при превенцията и бързото преодоляване на симптомите на Цинков дефицит, засилва кореновото развитие, оцветяването на плода и добива, намалява окапването. Недостиг на Цинк има при отмити кисели почви или в алкални почви. Намалена абсорбция на Цинк има при почви с високо съдържание на фосфат. Най – чувствителни са културите: плодни дървета и лозя, домати, зърнени, царевица, картофи и др. Продуктът е смесим с повечето използвани пестициди.

Внимание

Дозите и концентрациите могат да варират в зависимост от агрономическите условия. Възможни са множество приложения на ФОЛИСТИМ™ LSA Zn, когато е смесен с други агрохимикали. В случай на смесване с няколко продукта, винаги правете тест в малки количества. Да не се употребява по време на цъфтеж. Избягвайте пръскане в горещи и слънчеви дни. Придържайте се към препоръчаната концентрация независимо от обема на пръскане на акър (или хектар). В оранжерии не надвишавайте концентрация от 50 мл/100 л.

Култура	Доза		Време /начин на внасяне
	л/ха	л/100 л Мах. Концентр.%	
Зимни житни	1 - 1,5	0,5	От братене до първо видимо коляно
Царевица	0,8 - 1,5	1	1 внасяне във фаза 4-лист
Картофи	0,5 - 1	0,2 - 0,3	1 седмица след поникване
Зеленчукови	0,5 - 1	0,2 - 0,3	Внасяне при наличие на 4-6 листа
Лозя и плодни дървета	0,5 - 1	0,05 - 0,1	1-3 внасяния всеки 15 дни от преди цъфтеж до началото на развитие на плода
Капково	2 - 5		